م.ضفاف مهدي راضي م.م مسارة قيس علوان

جامعة تكريت

كلية العلوم /قسم علوم الحياة

المادة: الحشرات الطبية العملى

-: Lab 4

القمل الماص Sucking lice:-

حشرات صغيرة الحجم عديمة الاجنحة فقدت اجنحتها كصفة مكتسبة نتيجة وجودها على عائلها باستمرار و عدم الحاجة الطيران. ذات جسم جلدي رخو، الارجل متشابهة و هي متحورة للتعلق و تنتهي بمخلب مقوس يسهل للقمل الالتصاق بالجسم العائل، منطقة البطن كبيرة الحجم نسبيا تتكون من (7-9) حلقات واضحة التقسيم و لاتحمل قرونا شرجية. الذكور اصغر من الاناث ، مدبب البطن يحتوي على القضيب (Aedeagus) ، نهاية بطن الانثى مشطورة الى قسمين. اجزاء الفم ثاقبة ماصة (طفليات خارجية اجبارية).



انواع القمل الماص :ـ

يتطفل على الانسان ثلاث انواع من القمل الماص للدم هي :-

۱-قمل الراس Pediculus human capitis

تعود قمل الراس الى رتبة Anoplura حشرة صغيرة يبلغ طولها (2-3) ملم لونها رمادي على شكل معين ، البطن بيضية اعرض من الصدر حلقات البطن تكون واضحة يتركز وجوده خلف الاذنين و مؤخره الراس ، ينتقل قمل الراس من انسان لاخر عن

طريق ادوات الشخص المصاب مثل الامشاط و فرشاه الشعر . تحدث الاصابة بمعدل كبير بين تلاميذ المدارس .





Y-قمل الجسم Pediculus human corporis

تعود قمل الجسم الى رتبة Anoplura شكله بيضاوي يتراوح طوله بين (2-4) ملم يشبه قمل الراس و لكنه اصغر حجما و افتح لونا و لا توجد فواصل واضحة بين حلقات البطن ، توجد على الملابس الداخلية خاصة في الاماكن الملامسة بالجلد مثل منطقة الوسط و الرقبة و الاكتاف حيث يتركز في طيات و ثنيات الملابس و يتصل بالجسم فقط اثناء التغذية ، و ايضا ينتقل باستعمال ملابس الشخص المصاب او النوم في فراشه او مخالطة اشخاص المصابين بالقمل كما في المواصلات العامة و السجون و المدارس و الجنود .

